

ADULTS

SIDE EFFECTS AND TREATMENTS:

TETANUS AND DIPHTHERIA (TD)

There may be soreness, redness, or swelling where the shot was given. If these problems occur they usually start within hours to a day or two after vaccination. They may last 1-2 days. Tylenol and ibuprofen (non-aspirin) may be used to reduce soreness. Fever is not common with the vaccination.

INACTIVATED POLIO VACCINE (IPV):

There may be localized swelling and irritation at the injection site. No other side effects have been reported.

HEPATITIS B (HEP B):

Minor side effects include pain at the injection site and a mild to moderate fever.

MEASLES, MUMPS, RUBELLA (MMR):

You may experience a fever, a mild rash, and swollen lymph nodes. For the fever you can take Tylenol or Motrin. For the rash, avoid scratching. You can use Benadryl or calamine lotion to help with the itching. ****IF YOU GET A RASH MAKE SURE TO COME IN TO GET IT DOCUMENTED IN YOUR RECORD.**

HEPATITIS A (HEP A):

Minor side effects include pain and an swelling at the injection site. Soreness and tiredness usually occur 3-5 days after the vaccination.

TYPHOID:

Minimal side effects include fever, headache, and a local reaction (redness and/or swelling).

YELLOW FEVER:

Some side effects for this vaccine are a low-grade fever, headache, and tiredness or restlessness. Take Tylenol or Motrin for the fever and headache. **TRY TO REST.**

JAPANESE ENCEPHALITIS (JEV):

Tenderness, redness, and swelling at the site are some side effects for JEV. Other possible side effects include fever, headache, restlessness, and a rash.

成人用

副作用と処置：

破傷風・ジフテリア (TD)：

接種した患部の赤み、腫れ、炎症が起こることがあります。接種後症状は数時間から2日以内に現れ1-2日続くことがあります。タイレノールやイブプロフェン（非アスピリン系）を服用すると症状はおさまります。この種の予防接種での発熱はまれです。

不活化ポリオ接種 (IPV)：

接種後患部に腫れが生じることがありますが、それ以外の副作用は現在まで報告がありません。

B型肝炎 (HEP B)：

接種後患部に痛みを伴う軽い副作用と微熱を生じます。

はしか、おたふく風邪、風疹 (MMR)：

発熱、中度の発疹、リンパ腺の腫れが生じることがあります。発熱の際にはタイレノールやモートリンを服用し、発疹は患部を搔かずにヒスタミン反応を抑える、ベナドリルまたはカーマインローションを塗ってください。

※※発疹が出た場合にはクリニックにあるメディカルレコードに記載しておきましょう。

A型肝炎 (HEP A)：

接種部に痛みと硬化を伴う軽い副作用があります。接種後痛みと倦怠感が3-5日続きます。

チフス

発熱、頭痛、局所の赤みまたは腫れ等の極わずかな副作用があります。

黄疸

微熱、頭痛、倦怠感、不眠等の副作用があります。発熱や頭痛の場合タイレノール、モートリン等を服用してください。休養をとりましょう。

日本脳炎 (JEV)：

副作用として接種部の圧痛、赤み、腫れ等が生じます。その他の起こりえる副作用として、発熱、不眠、発疹等があります。