

PEDIATRICS

SIDE EFFECTS AND TREATMENTS:

DTP, TETRAMUNE, DTaP AND DT:

❖ The infant may be fussy and experience an elevated temperature of 100-102 degrees and/or some mild swelling and tenderness at the site for approximately 24-48 hours: May also cause lump under the skin that could last 4-6 weeks. Apply a cool compress. Treat the fever with Tylenol, make sure your child does not have allergy to the medication. When in doubt, consult a physician.

MMR (MEASLES, MUMPS AND RUBELLA):

❖ An elevated temperature can occur and a small number of children have developed a rash Within 7-10 days after receiving the injection lasting 2-5 days (This rash is not contagious). Treat the fever with Tylenol. Please consult your physician for other alternative medication.

Hib:

❖ Less than 1% experiences an elevated temperature or mild local reaction. Apply a cool Compress to the thigh. Treat the fever with Tylenol.

VARICELL/VARIVAX/CHICKENPOX:

❖ There may be soreness, redness or swelling at the sight. The patient may also break out in chickenpox and is contagious. There may also be a fever, but do not use any aspirin containing products to treat the fever.

HEPATITIS B/RECOMBIVAX/ENERGIX:

❖ Mild localized redness and swelling. Apply a cool compress for the first 24 hours then a warm compress.

IPV:

❖ Many children are a little sore at the site of the injection. No other side effects from the IPV have been reported.

PNEUMOCOCCAL (PREVNAR):

❖ About half of the children that receive the vaccination will have redness, discomfort and swelling at the site that can last for two days. 1% of the children that receive the vaccination may also develop a fever.

***CONTACT A PHYSICIAN OR THE EMERGENCY ROOM FOR ANY OF THE FOLLOWING ***

* Fever of 103.0 F/39.4 C or higher, prolonged screaming, high pitch crying episodes during which the child cannot be comforted rash with bleeding tendency, severe local reaction (swelling of the entire extremity), convulsion or seizure.

* You may give your child Tylenol every 4-6 hours for the first 24 hours after the immunizations even if the child is without fever. Only continue Tylenol after 24 hours if your child has a fever.

* DO NOT EXCEED 6 DOSES IN 24HOURS.

* Please remain in the Immunization Clinic waiting area for 20-30 minutes after your child has received immunizations to allow the Immunization Clinic staff to observe your child for an immediate allergic reaction.

小児用

副作用と処置

DTP (ジフテリア、破傷風、百日咳)

38.0℃-39.0℃の発熱、腫れ、圧痛が24-28時間継続したり、または皮膚に腫れ物ができ4-6週間続くことがあります。その際患部を冷やしてください。

発熱の際にはタイレノールを服用し、また薬にアレルギーがないか確かめてください。不明確な場合は医師にご相談ください。

MMR (はしか、おたふく風邪、風疹)

発熱、極少数の幼児は接種後に7-10時間以内に発疹が現れ、2-3日間続きます。(この発疹は伝染しません)。発熱の際にはタイレノールを服用させ、その他の薬の服用は医師にご相談ください。

インフルエンザ: Hib

1%以下の幼児が発熱または接種部の炎症があります。腿を冷やしてください。発熱の際にはタイレノールを服用してください。

水ぼうそう:VARICELL

接種後に痛み、赤み、腫れ等の症状があります。また伝染性の水ぼうそうを発症するかもしれません。発熱の際には、熱を下げる効果のあるアスピリンは服用しないでください。

B型肝炎:HEPATITIS B

軽度の赤みと腫れがあります。24時間患部を冷やし、その後24時間暖めてください。

ポリオ:IPV

多くの幼児が接種後、患部に痛みを感じます。その他の副作用は現在まで報告がありません。

肺炎球菌:PNEUMOCOCCAL

接種を受ける半数の幼児に、赤み、不快感、腫れが2日間続きます。また接種した幼児の1%に発熱がみられます。

※※※以下の症状が表れた場合は医師または急患室へご連絡ください※※※

※103.0 F/39.4 C以上の発熱、出血、接種部の高度の腫れ、けいれん、発作を伴い長時間泣きわめく。

※発熱が無くとも、接種後の24時間は4-6時間ごとにタイレノールを服用したほうがよいでしょう。24時間後に解熱しない場合にのみタイレノールを服用してください。

※24時間以内に6錠以上服用しないでください。

接種後20-30分はクリニックでお待ちください。予防接種担当者が、接種直後のアレルギー反応の有無を確認いたします。